Внимание! Клещевой энцефалит – инфекционное заболевание, в основе которого лежит повреждение головного и спинного мозга флавивирусом, передающимся человеку при укусах иксодовых клещей.

Самое большое число случаев заболевания регистрируется в конце весны и начале осени, это связано с увеличением числа клещей в это время. Заразиться вирусом клещевого энцефалита можно во время прогулок по лесу, парку, посещения мест отдыха на природе.

Симптомы: лихорадка, головная боль, судороги, рвота, нарушение координации движений, боли по ходу нервов, вялые парезы и параличи.

Профилактика клещевого энцефалита:

1. **соблюдение правил посещения лесных зон и мест отдыха на природе** в период активности клещей:

- использование одежды с длинными рукавами и штанинами, закрывающими большую часть тела, наличие панамы или кепки на голове;
- нанесение репеллентов на одежду перед прогулкой;
- тщательный осмотр одежды и тела на предмет выявления живых клещей;
- недопустимость самостоятельного удаления прицепившегося клеща с кожи;
- немедленное обращение за медицинской помощью в случае обнаружения присосавшегося насекомого.

2. **Вакцинация** включает в себя**: пассивную иммунизацию** – введение иммуноглобулина пациентам, не прививавшимся ранее от клещевого энцефалита (в случае укуса клеща) и **активную иммунизацию** – проведение прививок жителям района распространения заболевания за 1 месяц до сезона активности клещей.