СОВИГРИПП

Вакцина гриппозная инактивированная субъединичная

Показания для применения.

Для активной ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа без ограничения возраста.

Особенно показана лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:

- детям дошкольного возраста;
- лицам, часто болеющим ОРВИ;
- лицам, страдающим аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам);
- лицам с врожденным или приобретенным иммунодефицитом;
- работникам образования;
- и т.д.

Противопоказания для применения.

- Аллергические реакции на куриный белок или другие компоненты вакцины.
- Сильные поствакцинальные реакции (температура выше 40 °С, появление отека, гиперемии свыше 8 см в диаметре).

Способ применения и дозы.

Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний период. Возможна вакцинация в начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом.

Детям старше 3 лет вакцину вводят однократно внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (в область дельтовидной мышцы) в прививочной дозе 0,5 мл.

Детям до 3 лет вакцину вводят двукратно с интервалом 4 недели в передненаружную поверхность бедра внутримышечно в прививочной дозе 0,25 мл (1/2 дозы).

Меры предосторожности при применении.

В день вакцинации прививаемые должны быть осмотрены терапевтом с обязательной термометрией. При температуре выше 37°С вакцинацию не проводят.